

**Jaromír K.**

**Dobrý den pane Pour. Jelikož jsem si přečetl vaše rady ostatním chovatelům, včetně té mně, at' začátečníkům, tak pokročilým chovatelům, můžu říct, že jste opravdu člověk znalý veškeré problematiky ohledně slepic. Mám na vás tedy dotaz, který není z těch jednoduchých. Jednou jsem se jako řemeslník dostal k jedné starší rodině, kde jejich příbuzný dělal údajně výzkum ohledně drůbeže a prý zjistil, že při krmení řepou dochází k zastavení snůšky u slepic. Máte o tom také nějaké informace, popř.co za látku to způsobuje? Protože můj otec vždy tvrdil, že řepa začíná být od března jedovatá. Může to být myšleno jako krmení v tuto dobu? Předem děkuji za odpověď. JK**

## **KRMNÁ ŘEPA**

Pane Jaromíre, podobně rezolutní závěry, jako onen chovatel-výzkumník a váš pan otec nemohu potvrdit.

Domnívám se, že souvislost mezi krmením řepou a nízkou snáškou může pramenit z toho, že chovatel podává slepicím řepu ve větších objemech vůči ostatním složkám krmení, zejména jadrným. Řepa sice zvíře zasytí, ale protože není příliš vydatná (obsahuje až 90% vody), může vést k podvýživě a z ní vyplývající nízké snášce. Řepu bychom měli používat pouze jako doplněk stravy – v zimě někteří chovatelé zavěšují půlené bulvy, aby se slepice při jejich oklovávání zahřály.

Co se týká jarní „jedovatosti“ řepy, tam vidím příčinu ve špatném uskladnění, v jehož důsledku jsou bulvy napadeny plísní nebo hnilobou. Takovou řepu samozřejmě slepicím nepodáváme, neboť by mohla opravdu negativně ovlivnit jejich zdravotní stav.

Úspěšný rok 2012 přeje Vám i ostatním chovatelům

**Miroslav Pour, Skřivany**